



SPREMLJANJE BOLNIKA, KI SE ZDRAVI Z BIOLOŠKIM ZDRAVILOM REMICADE (infiximab)

PODATKI BOLNIKA

Datum: _____

PREISKAVE

<input type="checkbox"/> RA	<input type="checkbox"/> AS / PsA
<input type="checkbox"/> Laboratorijski testi	<input type="checkbox"/> Laboratorijski testi
<input type="checkbox"/> Klinični dejavniki	<input type="checkbox"/> Klinični dejavniki
<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> DA
<input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> NE
<input type="checkbox"/> Sledenje - RA	<input type="checkbox"/> Aktivnost - SpA
<input type="checkbox"/> DAS28+12	<input type="checkbox"/> BASDAI
<input type="checkbox"/> Promis HAQ	<input type="checkbox"/> BASFI
	<input type="checkbox"/> Promis HAQ

MERILA ZA NADALJNJE ZDRAVLJENJE

- ni aktivne okužbe in bolnik ni bil zdravljen z antibiotikom (i.v. zadnje 4 tedne oz. peroralno zadnja 2 tedna)
- odprte rane
- nosečnost
- cepljenje

_____. APLIKACIJA- Datum: _____ Serijska številka zdravila: _____

ODMERJANJE ZDRAVILA REMICADE (infiximab)

Odmerek zdravila se izračuna glede na bolnikovo diagnozo in telesno maso:

- RA: **3 mg/kg** v intravenski infuziji; AS / PsA: **5 mg/kg** v intravenski infuziji;
v času 2 ur v času 2 ur

TT bolnika: _____ kg ODMEREK = _____ mg Parafa zdravnika: _____

Pogostost: _____ Način aplikacije: _____

Vse bolnike, ki prejmejo zdravilo Remicade, morate opazovati najmanj 1 do 2 uri po infuziji zaradi akutnih infuzijskih reakcij.

Pripravljeno zdravilo mora biti uporabljeno v 4 urah.

vitalne funkcije	ura	RR (mmHg)	pulz
pred infuzijo			
med infuzijo			
po infuziji			

POSEBNOSTI

KAZALCI KAKOVOSTI

Zapleti med aplikacijo zdravila: alergične reakcije (kožni izpuščaji, srbečica, koprivnica); hipertenzija/hipotenzija; vročina; slabost; glavobol

Ostali zapleti zdravljenja: okužbe dihal, pljučnica; okužba sečil; povišanje jeternih testov; nevtropenija ali trombocitopenija; sepsa; rak; demielinizirajoče bolezni; ostalo:

Ostalo:

Parafa DMS / diplomirani zdravstvenik: _____